


Augmentation du pénis par section du ligament suspenseur

-  **Durée intervention : 1h**
-  **Anesthésie : locale avec sédation**
-  **Hospitalisation : non**
-  **Résultats : immédiat**
-  **Récupération : 7-10 jours**
-  **A partir de 4 400 CHF**

On peut augmenter la longueur du pénis de 2 à 4 cm au repos, en sectionnant la partie antérieure du ligament suspenseur. Cette augmentation de longueur ne se verra que très peu en érection, sauf si il y est associé une lipoaspiration de la zone pubienne.

On peut également en augmenter la circonférence de la verge, grâce aux injections d'injection d'acide hyaluronique ou de graisse, de 2 à 3.5 cm. Cette différence se verra de façon significative au repos et plus discrètement en érection.



Technique :

Anesthésie locale. Incision de 3 cm en forme de V inversé à la base du pénis, masquée dans la zone pileuse et dans les zones d'ombres naturelles. La partie antérieure du ligament suspenseur est libérée et incisée. Fermeture, puis mise en place de colle chirurgicale biologique.

Parfois, on y associe une lipoaspiration de la zone pubienne pour en optimiser le résultat.

Résultats :

Délai résultats définitifs :

4-7 jours (hématomes, gonflement)

Longévité résultats :

Définitif

Avant intervention :

Arrêt tabac 1 mois avant

Pas de prise d'Aspirine 10 jours avant intervention, informer le Dr Lucas de toute prise de médicament anticoagulants (Sintrom, Coumadine, Eliquis, etc..) pour en organiser l'arrêt ou le relai.

Prendre Arnica gélules 5 gélules 5 fois par jour pdt 5 jours avant intervention pour prévenir hématomes

Rasage de la zone pubienne 3 jours avant l'intervention.

Intervention :

Douleur : la douleur pendant l'intervention sera quasi-inexistante, avec une anesthésie adaptée

Durée intervention : 60 minutes

Anesthésie : locale avec sédation ou générale si souhait du patient

Lieu : bloc opératoire

Ambulatoire (sans hospitalisation)

Après intervention:

Douleur post-opératoire : 1/10 répondant souvent au Dafalgan

Eviction sociale :

Gonflement et hématomes pendant 4-7 jours

Ablation fils : pas de fils

Reprise travail: immédiat

Reprise sport : 2-3 semaines

Consignes:**Acide hyaluronique**

Contrôle Dr Lucas 2 jours, 2 semaines, 3 mois

Graisse

Désinfection de la cicatrice avec Merfen désinfection pendant 7 jours.

Pas de port de sous-vêtements trop serrés et pas de rapports sexuels pendant 3 semaines.

Douche dès 2^{ème} jour : pendant 10 jours, ne pas frotter de façon trop appuyée, sécher avec linge propre en tamponnant.

Antibiothérapie préventive pendant 3 jours par Augmentin 1 g 2 fois par jour.

Contrôle Dr Lucas 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 3 mois.

Complications:

- Infection, hématome

- Diminution de la sensibilité sur le dos du pénis : elle revient les premières semaines

- Augmentation pénienne et érection : il n'y a pas de conséquence sur l'érection, suite à ce type d'intervention.

Alternatives et opérations qui peuvent être combinées :

On peut augmenter la circonférence de la verge, grâce aux injections d'acide hyaluronique ou de graisse, de 2 à 3.5 cm. Cette différence se verra de façon significative au repos et plus discrètement en érection.

Dr Dominique Lucas

Chirurgien plasticien et esthétique FMH, EBOPRAS

Ancien Chef de Clinique universitaire CHUV

Membre FMH (Fédération médicale helvétique), KCCS (Korean Society of Cosmetic Surgery), ISAPS (International Society of Aesthetic Surgery), AMGE (association Médecins canton Genève)

Drlucasplasticsurgery@gmail.com

+41 77 992 95 97

Boulevard Helvétique 26, 1207 Genève

